

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreepolder



Weidevogels in 2019 en 2020

In 2019 zijn 52 verschillende soorten vogels waargenomen. Van dit aantal hebben 13 soorten in de polder gebroed, waaronder een groot aantal weidevogels. De met schrikdraad afgerasterde



hooilandpercelen (tegen vos en huiskat) waren daarbij zeer in trek, maar flink wat weidevogels hebben ook met succes buiten de schrikdraad-afrastering gebroed. Grutto (4 broedparen), Scholekster (3 broedparen) en Tureluur (8 broedparen) hadden in 2019 een goed broedjaar, evenals de in 2019 talrijk aanwezige Kievit (40 broedparen).

De BTS-waarde (Bruto Territoriaal Succes) van genoemde vogelsoorten lag in 2019 boven 70%. Niettemin gaan ieder jaar veel kuikens verloren door predatie. (Uit "Natuurinventarisaties Wilmkebreepolder 2019")

Het jaar 2020 geeft een heel ander beeld. Aanvankelijk komt de broedperiode goed op gang met 46 broedparen Kievit, 4 broedparen Grutto, 9 broedparen Tureluur en 4 broedparen Scholekster.



Slechts 1 gruttopaar is direct gaan broeden in april, de andere paren Grutto hebben gewacht tot na de droge periode, maar ook toen zijn de jongen uit het gras geplukt door de Zwarte kraai. Door de




langdurige droogte zijn veel jonge vogels omgekomen door honger of door predatie. Hoofdpredatoren lijken de Zwarte kraaien die voortdurend jonge vogels uit de polder roofden om als voer te dienen voor hun eigen jongen. De helft van de kievit is opnieuw begonnen met een nest na de droge periode. Ook de Tureluur is bijna alle jonge vogels kwijtgeraakt. Scholekster en Bergeend hebben niet geleden onder droogte en/of predatie. Het feit dat de Scholekster zijn jongen voert heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen. De jonge scholeksters verstoppen zich in de hoge brandnetels tot de ouders met voer ze roepen.

De jongen van Grutto, Tureluur en Kievit moeten zelf hun voer, insecten, zoeken en moeten dus in het open veld rondlopen en zijn zo veel zichtbaarder voor de Zwarte kraai en andere predators; de ouder vogels waken en beschermen alleen.


Hieronder staan de grafieken door de jaren heen van aantallen territoria en broedparen met grote jongen.






In de volgende grafiek is te zien dat een aantal kieviten in 2020 een tweede broedpoging waagden.



Tenslotte een aantal grafieken waarin per weidevogel te zien is hoe groot het broedsucces is geweest in de afgelopen jaren. De jaren 2013 en 2014 laten zien wat de vos heeft aangericht, het jaar 2020 wat droogte en predatie door Zwarte kraai heeft veroorzaakt.







In de 'Natuurinventarisaties Wilmkebrek 2020', die in 2021 zullen worden gepubliceerd, zal gedetailleerd ingegaan worden op de weidevogels en andere fauna en flora in de Wilmkebrek-polder.